

AMPI ESTREP CON FLUMETASONA®

Reg. SAGARPA No. Q-0296-033

Polvo para Suspensión inyectable

Antibiótico de amplio espectro con antiinflamatorio



FORMULA:

Una vez hecha la mezcla, cada ml contiene:

Flumetasona 0.038 mg

Ampicilina sódica equivalente a 12.5 mg
de ampicilina base

Ampicilina trihidratada equivalente a 37.5mg
de ampicilina base

Sulfato de estreptomicina
equivalente a 125.0 mg
de estreptomicina base
Diluyente, c.b.p. 1 ml

USO EN: Bovinos, Ovinos, Equinos, Porcinos, Caprinos, Caninos y Felinos.



DESCRIPCION:

AMPI ESTREP CON FLUMETASONA® es una combinación de antibióticos de amplio espectro con acción sinérgica inmediata y sostenida, potencializados con un corticosteroide que permite a los antibióticos difundirse y actuar rápidamente a través de los tejidos dañados.

En esta formulación única, se combinan dos ampicilinas, la sódica de acción inmediata y la trihidratada que retarda su aparición a nivel sérico, resultando una acción sostenida de 22 a 24 horas.

La estreptomicina tiene una acción sinérgica con las ampicilinas.

INDICACIONES:

AMPI ESTREP CON FLUMETASONA® es de gran valor terapéutico en infecciones provocadas por bacterias gram positivas y gram negativas que afectan al aparato respiratorio, al reproductor, vías urinarias, órganos gastrointestinales, así como infecciones del puerperio y

Es de especial utilidad en pasteurelisis, edema maligno, rinitis atrófica, carbón sintomático, bronco y pleuroneumonías, influenza, leptospirosis, shigelosis, erisipela, mastitis y colibacilosis.

VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular profunda.

DOSIS:

1 g de la fórmula por cada 150 kg de peso
(1 ml por cada 7.5 Kg de peso corporal).

ADVERTENCIAS:

Nota importante: En el tratamiento de infecciones en animales gestantes y en producción, no utilizar el diluyente que es el que contiene flumetasona. En ese caso sustituya por agua estéril o solución salina fisiológica estéril.

Es conveniente considerar que la asociación de las dos ampicilinas tiene un efecto sinérgico que potencializa su actividad, requiriéndose una dosis menor a la de cualesquiera de las sales en forma aislada.

No utilizar este producto 30 días antes del sacrificio de animales destinados al consumo humano.

No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 60 horas después de la última aplicación.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

No se deje al alcance de los niños.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

PRESENTACIONES:

Frasco ampula con 1 g con diluyente de 20 ml

Frasco ampula con 2 g con diluyente de 40 ml



ANTIBIOTICOS