

CEFTIOPAN 50 RTU

Reg. SAGARPA No. Q-0296-074

Suspensión inyectable

Antibiótico



FORMULA:

Cada 100 ml. contienen:

Ceftiofur HCl 5,000 mg
Vehículo, c.b.p. 100 ml

USO EN: Bovinos, Equinos, Porcinos y Ovinos



DESCRIPCION:

CEFTIOPAN 50 RTU®, es un antibiótico bactericida de amplio espectro, del grupo de las cefalosporinas de tercera generación. **Es una suspensión estéril lista para su uso**, que contiene 50 mg por ml de Ceftiofur HCl en un vehículo oleoso.

Su acción terapéutica empieza entre los 45 y 50 minutos posteriores a su aplicación.

Ya que se elimina rápidamente por la orina, su aplicación no obstaculiza el uso inmediato de la leche para consumo humano.

INDICACIONES:

CEFTIOPAN-50 RTU®, está indicado principalmente en el tratamiento de infecciones por bacterias Gram positivas: Actinobacillus spp, Haemophilus spp y Streptococcus spp, y Gram negativas como Actinomyces spp, Corynebacterium spp, Pasteurella spp y Salmonella spp, incluyendo aquellas productoras de betalactamasa.

En bovinos y ovinos está indicado para el tratamiento de neumonías bacterianas, pasteurelosis y gabarro, por mencionar sólo algunas.

VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular.

DOSIS:

1 a 2 mg por kg de peso equivalentes a:

Bovinos: 1 a 2 ml de CEFTIOPAN 50 RTU® por cada 50 kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días.

Equinos: 2.2 ml de CEFTIOPAN 50 RTU® por cada 50 kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días.

Porcinos: 1 a 3 ml de CEFTIOPAN 50 RTU® por cada 50 kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días.

Ovinos: 1.1 a 2.2 ml de CEFTIOPAN 50 RTU® por cada 50 kg de peso, cada 24 horas por 3 a 5 días.

ADVERTENCIAS:

Manténgase dentro de su empaque en un lugar fresco y al abrigo del sol.

Agite bien el producto antes de usarlo.

No aplicar en combinación con antibióticos aminoglucósidos y furosemida.

Una vez abierto el producto, deberá agotarlo en los 14 días siguientes.

No se deje al alcance de los niños.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Ver instructivo anexo.

TIEMPO DE RETIRO:

En carne 24 horas. La leche para consumo humano puede usarse inmediatamente después de la aplicación.

PRESENTACIONES:

Frascos ampola con 25, 100 y 250 ml



ANTIBIOTICOS