

DIASTOPAN®

Reg. SAGARPA Q-0296-060

Polvo Oral

Antidiarreico no Antibiótico con Electrólitos y Dextrosa



FORMULA:

Cada 100 g. contienen:

Cascarillas de Semillas de <i>P. plántago</i>	45.67 g
Dextrosa Monohidratada	36.70 g
Bicarbonato de Sodio	2.25 g
Cloruro de Sodio	5.50 g
Acido Cítrico Anhidro	3.05 g
Cloruro de Potasio	2.38 g
Indicador Rojo.....	350 mg
Excipiente c.b.p. 100 g	

USO EN: Becerros



DESCRIPCION:

DIASTOPAN®, es un revolucionario concepto para el tratamiento no antibiótico de diarreas en becerros. Su precisa formulación en elementos energéticos y electrolitos corrige la deshidratación y proporciona una fuente inmediata de energía que posibilita una rápida recuperación. El gel de Mucotroph P, cuya composición es muy semejante al moco producido por las vellosidades intestinales, las vigoriza, las protege y repara el daño provocado por las bacterias. Al formar un contenido sólido en el intestino favorece la proliferación de células entéricas y por consecuencia se estimula la producción local de inmunoglobulinas que previenen recaídas.

DIASTOPAN®, además, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, fuente primaria de energía para las células entéricas, lo que reduce la demanda de glucosa y favorece la producción de lactasa evitando así las diarreas osmóticas que tienden a agravar el caso.

A diferencia de los antibióticos que destruyen toda la flora bacteriana, DIASTOPAN®, deja intacta a la flora saprófita normal.

INDICACIONES:

DIASTOPAN®, es un tratamiento no antibiótico de diarreas en becerros, producidas por *E. coli* enteroxigénico (Serotipos k 99 y O), *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*.

VIA DE ADMINISTRACION:

Oral.

DOSIS:

A la observación del primer síntoma de diarrea, suspender la leche o el sustituto y administrar DIASTOPAN®, con el siguiente programa:

Un sobre de 75 g disuelto en 1.5 litros de agua tibia para bebida, cada 12 horas por 3 veces consecutivas. Una cuarta dosis deberá darse disuelta en 750 ml de agua tibia y 750 ml de leche o sustituto. Después podrá reanudarse la alimentación acostumbrada.

ADVERTENCIAS:

Use siempre agua para bebida. Ya que DIASTOPAN®, forma un gel espeso en pocos minutos, deberá administrarse la suspensión inmediatamente después de preparada o resultará demasiado espesa para ser tragada por el becerro.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

**No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.**

Su venta requiere receta médica.

PRESENTACIONES:

Cubeta de plástico conteniendo 20 sobres con 75 g cada uno para 5 tratamientos.

Cubeta de plástico con 2,400 kg; incluye tarro dosificador para 8 tratamientos.



ANTIDIARREICOS