

# CALCIPROTEIN VITAMINADO Rx

Reg. SAGARPA Q-0296-019

**Solución inyectable**



## FORMULA:

### Cada 500 ml contiene:

Gluconato de calcio .....	80,000 mg
Acido bórico .....	16,000 mg
Glucosa dextrógrica .....	90,000 mg
Hipofosfito de magnesio .....	7,300 mg
Aminoácidos .....	50 mg
Tiamina, Vit. B <sub>1</sub> .....	100 mg
Riboflavina, Vit. B <sub>2</sub> .....	40 mg
Acido pantoténico, Vit. B <sub>3</sub> .....	40 mg
Nicotinamida, Vit. B <sub>5</sub> .....	500 mg
Piridoxina, Vit. B <sub>6</sub> .....	100 mg
Vehículo, c.b.p. 500 ml	

**USO EN:** Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Lechones



## DESCRIPCION:

CALCIPROTEIN VITAMINADO Rx, es una solución estéril de gluconato de calcio al 16%, adicionado con dextrosa, fósforo, magnesio, vitaminas del complejo B y aminoácidos. Eficaz para el tratamiento de deficiencias de calcio relacionadas con el parto y la lactancia, raquitismo y deficiencias nutricionales.

## INDICACIONES:

CALCIPROTEIN VITAMINADO Rx, está indicado para prevenir y tratar deficiencias de calcio, fósforo y magnesio; excelente reconstituyente en caso de convalecencias, trastornos metabólicos, raquitismo, agotamiento, fiebre de leche o hipocalcemia y coadyuvante en caso de estrés excesivo.

Calcioterapia de máxima eficacia y seguridad, fosforado, vitaminado y con aminoácidos

CALCIPROTEIN VITAMINADO Rx® está indicado en la hipocalcemia o fiebre de leche de hembras parturientas y en problemas relacionados, como eclampsia, paresia o tetania de la preñez.

Osteomalacia y raquitismo. Intoxicaciones por metales pesados y envenenamiento por piquetes de insectos o mordeduras de serpiente.

De utilidad en algunas alergias y problemas de la coagulación de la sangre.

En general para deficiencias nutricionales de calcio.

Está indicado en trastornos de la conducción nerviosa y regulación del tono muscular así como en la debilidad de contracciones durante el parto.

## VIA DE ADMINISTRACION:

Intravenosa, muy lentamente (de 20 a 30 minutos por cada 500 ml). Pueden emplearse las vías intramuscular o subcutánea.

## DOSIS:

**Bovinos y Equinos:** 250 a 500 ml

**Porcinos:** 100 a 200 ml

**Ovinos y Caprinos:** 30 a 60 ml

La dosis a emplear depende de la gravedad del caso y del criterio del M.V.Z.

## ADVERTENCIAS:

Hacer siempre la aplicación endovenosa muy lentamente (de 20 a 30 minutos por cada 500 ml).

Todas las sales de calcio por vía intravenosa pueden favorecer la presentación de shock.

El bloqueo cardiaco puede presentarse especialmente en el caballo.

No se administre en combinación con sulfas. El producto deberá calentarse a la temperatura del cuerpo para su aplicación. La carne y leche de animales tratados puede ser consumida 24 horas después de haberse aplicado el producto.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

**No se deje al alcance de los niños.**  
**Consulte al Médico Veterinario.**  
**Su venta requiere receta médica.**

## PRESENTACION:

Frasco ampula con 500 ml



CORRECTORES METABOLICOS, VITAMINAS Y MINERALES