

# ANAPIRO®

Reg. SAGARPA Q-0296-002

**Polvo para suspensión inyectable**

Específico para el tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis.

Antiparasitario de doble acción



## FORMULA:

2 x 1 g y 3 x 1.5 g

**Una vez hecha la suspensión, cada ml contiene:**

Oxitetraciclina clorhidrato ..... 100 mg

4-4 (diazooamino) Dibenzamidina

Diaceturato ..... 50 mg

Diluyente, c.b.p. 1 ml

**USO EN:** Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos



## DESCRIPCION:

ANAPIRO®, es un antiparasitario que posee la formulación precisa para el tratamiento de dos parasitemias, la anaplasmosis y la piroplasmosis (babesiosis) cuyo diagnóstico clínico diferencial en campo se dificulta.

Ambos componentes son considerados como drogas de elección y a la dosis recomendada hacen desaparecer los síntomas en 24 horas, eliminando la mayor parte de los parásitos existentes.

En los animales que sobreviven se produce un estado inmune que los protege de reinfecciones.

## INDICACIONES:

ANAPIRO®, posee una acción directa y sinérgica en contra de los agentes causales de la anaplasmosis y piroplasmosis, además de tener efecto terapéutico en contra de Theilerias, Tripanosomas y Trichomona foetus, de bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

De utilidad cuando no es posible establecer diagnóstico diferencial.

## VIA DE ADMINISTRACION:

Exclusivamente Intramuscular.

## DOSIS:

10 mg por kg de peso, equivalentes a 1 ml por cada 15 kg. Debe repetirse la dosis cada 24 horas, a juicio del MVZ, hasta lograr la recuperación total.

ANAPIRO® 2 x 1 g es la presentación precisa para tratar un animal de 300 kg de peso y el de 3 x 1.5 g es para tratar un animal de 450 kg de peso.

Para tratar la tricomoniasis genital de toros, disolver el contenido de un frasco de ANAPIRO® y su diluyente en 80 ml de agua limpia y aplicar localmente dentro de la cavidad de la vaina prepucial, manteniendo cerrado el orificio manualmente y dando masaje por espacio de 10 a 15 minutos para que la solución de ANAPIRO® penetre a todos los pliegues de la mucosa. Repetir el tratamiento 5 días seguidos y de ser necesario, otros 5 días más.

## ADVERTENCIAS:

No deberá usarse 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

La leche no deberá consumirse hasta 60 horas después de la última aplicación.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

**No se deje al alcance de los niños.**

**Consulte al Médico Veterinario.**

**Su venta requiere receta médica.**

## PRESENTACIONES:

Frasco con 20 ml. (2 x 1 g)

Frasco con 30 ml. (3 x 1.5 g)



DESPARASITANTES