

CLOSANTEL PANAVET 5% ORAL®

Reg. SAGARPA Q-0296-059

Solución oral

Fasciolicida y antihelmíntico de amplio espectro, acción prolongada y efecto contra algunos artrópodos



FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Closantel base 5 g
Vehículo, c.b.p. 100 ml

USO EN: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Conejos y Caninos



DESCRIPCION:

CLOSANTEL PANAVET 5% ORAL® es un potente antihelmíntico de amplio espectro y fasciolicida de acción prolongada, de la familia de las salicilanilidas. Su principal activo se liga a las proteínas plasmáticas, actuando cuando entra en contacto con los nemátodos hematófagos o helmintos que habitan en los conductos biliares, siendo tóxico sólo para ellos.

INDICACIONES:

CLOSANTEL PANAVET AL 5% ORAL®, elimina a Fasciolas hepática, gigante y magna, tanto en sus formas adultas, como larvianas, inhibiendo además la producción de huevecillos de los platelmintos o duelas adultas.

Elimina a Haemonchus y otros nemátodos gastrointestinales hematófagos con una eficacia próxima al 100%. Actúa también en contra de las larvas parasitarias de Hypoderma bovis, H. lineatum, Oestrus ovis, Dermatobia hominis y Melophagus ovinus.

CLOSANTEL PANAVET AL 5% ORAL® es eficaz y totalmente seguro a la dosis recomendada, su efecto residual perdura más allá del periodo prepatente de los

helmintos hematófagos. No es mutagénico, teratogénico o embriotóxico ni afecta el comportamiento sexual de los animales. Es compatible con manejos del ganado como vacunaciones o baños garrapaticidas, es un excelente antihelmíntico para establecer programas de desparasitación efectivos y de bajo costo.

VIA DE ADMINISTRACION:

Exclusivamente por vía oral.

DOSIS:

Bovinos: Helmintos o Artrópodos, 1 a 2 ml por cada 10 kg. de peso.

Caprinos: Helmintos o Artrópodos, 1 a 2 ml por cada 10 kg. de peso.

Equinos: Helmintos o Artrópodos 1 a 2 ml por cada 10 kg. de peso.

Conejos: Helmintos, 0.5 a 1 ml por cada 5 a 10 kg de peso; Artrópodos, 0.5 a 1 ml por cada 5 kg de peso.

Caninos: Helmintos o Artrópodos 2 a 3 ml por cada 10 kg de peso.

ADVERTENCIAS:

De emplear la dosis mas baja, no usar la leche de vacas tratadas con este producto o la carne destinada a consumo humano, hasta 28 días después de la última aplicación. En el caso de la dosis más alta, el tiempo de espera deberá ampliarse a 65 días.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

No se deje al alcance de los niños.

Consulté al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

PRESENTACIONES:

Garrafas de plástico con 100, 250 y 500 ml



DESPARASITANTES