

# SYNCRO-GEN®

Reg. SAGARPA Q-0296-083

**Solución inyectable**

Agente luteolítico y sincronizador del celo



## FORMULA:

### Cada ml contiene:

Cloprostenol Sódico ..... 265 mcg  
equivalente a 250 mcg de Cloprostenol base  
Vehículo, c.b.p. 1 ml

**USO EN EMBRAS:** Bovinos, Equinos y Porcinos



## DESCRIPCION:

SYNCRO-GEN, es un análogo funcional sintético, cuya función principal consiste en la lisis del cuerpo lúteo.

## INDICACIONES:

SYNCRO-GEN, por su acción luteolítica, está indicado en Bovinos, Equinos y Porcinos para el tratamiento de disturbios reproductivos, sincronización de partos, expulsión de fetos momificados y/o macerados. Coadyuvante en el tratamiento de quistes ováricos luteales y tratamiento de celos silenciosos. Su función principal consiste en la lisis del cuerpo lúteo e iniciar un nuevo ciclo estral.

## VACAS:

- 1.-Quistes foliculares luteinizados.
- 2.-Quistes luteínicos.
- 3.-Piometas y endometritis, conjuntamente con antibióticos.
- 4.-Momificación y maceración fetal.
- 5.-Regresión de los cuerpos lúteos múltiples generados por la superovulación.
- 6.-Terminación de la preñez, incluyendo inducción del parto.

## YEGUAS:

- 1.- Diestro persistente.
- 2.- Terminación de pseudo preñez.
- 3.- Terminación de anestro lactacional si hay cuerpo lúteo.

- 4.- Iniciación de los ciclos estrales en algunas yeguas con problemas.
- 5.- Inducción de leuteolisis en metritis.
- 6.- Inducción de aborto antes del desarrollo de las capas endometriales.

## CERDAS:

Su principal uso es en la sincronización de partos y tratamiento del síndrome de mastitis - metritis - agalactia (MMA) y en general en las condiciones en que sea precisa la regresión del cuerpo lúteo, como en la momificación de los fetos. Se le utiliza en el síndrome de la lactación deficiente.

## VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular.

## DOSIS:

**Bovinos:** 2 ml por animal  
**Equinos:** 1 ml por animal  
**Porcinos:** 0.7 a 1 ml animal

## ADVERTENCIAS:

No deben manejarlo las mujeres embarazadas, personas asmáticas o con problemas bronco-pulmonares, éstas deberán evitar contacto con el producto. El Cloprostenol, como cualquier prostaglandina, se puede absorber por vía transdérmica, lo cual puede provocar bronco espasmos o abortos. En caso de contacto accidental, se aconseja lavar con agua y jabón abundantemente. Tiene un tiempo de retiro de 48 horas.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

**No se deje al alcance de los niños.**  
**Consulte al Médico Veterinario.**  
**Su venta requiere receta médica cuantificada.**

## PRESENTACIONES:

Frascos con 2 y 20 ml

