

UROSEMID®

Reg. SAGARPA Q-0296-035

Solución inyectable

Diurético



FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Acido-4-Cloro-N-Furfuril-5-Sulfamoil-
Antranílico (Furosemida) 5 g
Vehículo, c.b.p. 100 ml

USO EN: Bovinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Felinos



DESCRIPCION:

UROSEMID® contiene furosemida, un derivado del ácido antranílico de propiedades diuréticas con acción sobre los túbulos renales distales y proximales, así como en la porción ascendente del asa de Henle, a diferencia de otros diuréticos como los mercuriales y las tiazidas.

Presenta una estrecha relación dosis-efecto, es decir a mayores dosis se elevan proporcionalmente los valores para el sodio y el cloro en orina; aunque normalmente se presenta una disminución del potasio.

INDICACIONES:

UROSEMID® está indicado en estado de enfermedad en donde se produce la acumulación anormal de líquidos extracelulares en los tejidos que dan lugar a edema como: edema mamario del bovino, edema por congestión cardiaca del caballo, edemas congestivos localizados, aquellos por mordeduras de serpientes o piquetes de insectos ponzoñosos, ascitis, enfermedades congestivas del hígado, como hígado graso o cirrosis tóxica. Enfermedades renales incluyendo el síndrome nefrótico. De gran utilidad en tumefacciones edematosas de extremidades, pulmones, cerebro y riñones.

VIA DE ADMINISTRACION:

Intramuscular o intravenosa.

DOSIS:

Bovinos y equinos: 0.5 a 1 mg por kg de peso, 1 a 2 veces al día en lapsos de 6 a 8 horas, equivalentes a 1 a 2 ml por cada 100 kg de peso.

Porcinos: 5 mg por kg de peso, equivalentes a 0.5 ml por cada 50 kg de peso.

Caninos y Felinos: 2.5 mg por kg de peso, equivalentes a 0.1 ml por cada 10 kg de peso, 1 a 2 veces al día en lapsos de 6 a 8 horas.

ADVERTENCIAS:

La acción de la furosemida es aditiva a la de la mayoría de otros diuréticos, pero no así a la del ácido etacrínico. No aplicar ambos diuréticos juntos. Su administración prolongada puede dar lugar a hiperuricemia.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deberán ser sacrificados hasta 48 horas después de la última aplicación. La leche de los animales tratados no deberá usarse para consumo humano hasta 48 horas después de la última aplicación. No se use en equinos destinados al consumo humano.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.

**No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.**

PRESENTACIONES:

Frasco con 10 ml

