

Diastopan®

Reg. Q-0296-060

ISO 9001

Polvo oral soluble

Nutracéutico antidiarreico.

Fórmula

Cada 100 g contienen:

Cascarilla de semillas de <i>Psyllium</i> (Plántago)	45.67 g
Dextrosa Monohidratada	36.7 g
Bicarbonato de Sodio	2.25 g
Cloruro de Sodio	5.50 g
Ácido Cítrico Anhidro	3.05 g
Cloruro de Potasio	2.38 g
Indicador rojo	350 mg
Excipiente c.b.p.	100 g

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche (becerros): Indicado en el tratamiento de diarreas en becerros.

Particularmente útil en infecciones gastrointestinales en becerros causadas por *E. coli* enterotoxigénica (serotipo K99), *Salmonella enteritidis* y *Salmonella typhimurium*.

Administración y Dosis

Vía Oral.

Dosis sugerida:

Especies	Modo de empleo	
	Toma	g/ l por paciente
Bovinos productores de carne y leche (becerros)	1 – 3	Disolver 75 g en 1.5 l agua de bebida/ 35-75 kg p.v.
	4	Disolver 37.5 g en 750 ml agua de bebida / 35-75 kg p.v. y 37.5 g en 750 ml agua de leche/ 35-75 kg p.v.

La misma dosis debe repetirse cada 12 horas en función del criterio del Médico Veterinario.

La duración sugerida del tratamiento es de 2 días continuos.

Control de la Diarrea

Dosificaciones por presentación:

Especie	Presentación	# dosis por presentación	# pacientes por presentación
Bovinos productores de carne y leche (becerros)	20 x 75 g	20 dosis	5 pacientes
	2.4 kg	32 dosis	8 pacientes

Propiedades farmacológicas

Diastopan® es un revolucionario concepto para el tratamiento de diarreas en becerros sin antibiótico. Su precisa formulación en elementos energéticos y electrolitos que corrigen la deshidratación y proporcionan una fuente inmediata de energía que favorece la rápida recuperación del paciente.

El gel que forma **Diastopan®**, tiene una composición semejante al moco producido por las vellosidades intestinales por lo que les protege y auxilia a reparar daño

Al formar un contenido semisólido en el intestino se favorece la proliferación de células entéricas y por consecuencia se estimula la producción local de inmunoglobulinas las cuales previenen recaídas.

Diastopan®, además, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, fuente primaria de energía para las células entéricas, lo que reduce la demanda de glucosa y favorece la producción de lactasa evitando así las diarreas osmóticas que tienden a agravar el caso.

Al no contener antibiótico, **Diastopan®** no afecta la microbiota intestinal evitando superinfección y por el contrario favoreciendo su proliferación normal.

Efectos secundarios y advertencias

No se han reportado efectos secundarios.

Uso en gestación, lactación o parto

No aplica.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

Tiempo de retiro

Carne: 0 horas.

Leche: 0 horas.

Diastopan®

PANAVET®
Salud Animal



Control de la Diarrea

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Disolver en agua de bebida tibia.

Disolver completamente antes de administrar.

Al ser reconstituido, **Diastopan**[®] forma un gel denso color rojo que debe ser administrado de inmediato.

Presentación

Polvo oral soluble.

Cubeta con 20 sobres de 75 g cada uno.

Cubeta con 2.4 kg con dosificador.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

Reg. Rep. Dominicana: 5144

panavet@panavet.com.mx

panavet.com.mx

(+52) 442 309 5700

Panavet[®] - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139

Diastopan[®]

PANAVET[®]
Salud Animal

