

Diclofepan®

Reg. Q-0296-090

ISO 9001

Polvo y diluyente para suspensión inyectable

Combinación de Penicilinas G de corta y larga acción (L.A.) con antiinflamatorio no esterooidal (AINE).

Fórmula

Una vez hecha la suspensión cada frasco contiene:

Polvo:	
Penicilina G Benzatínica	3.0 MUI
Penicilina G Procaína	1.5 MUI
Penicilina G Potásica	1.5 MUI
Estreptomocina	2.5 g
Diluyente:	
Diclofenaco sódico	225 mg
Vehículo c.b.p.	15 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caprinos y ovinos: Indicado en el tratamiento de infecciones sistémicas y locales causadas por microorganismos G+ y G- con componente inflamatorio y febril.

Eficaz en infecciones causadas por *Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus spp, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Fusobacterium necrophorum, Leptospira spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.*, entre otros.

Administración y Dosis

Vía IM profunda.

Dosis sugerida:

Especies	Dosis	
	MUI/ kg p.v.	ml
Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caprinos y ovinos	10,000 MUI	1 ml/ 40 kg p.v.

La misma dosis puede repetirse a las 72 horas en función del criterio del Médico Veterinario.

La duración sugerida del tratamiento es de 1 a 2 aplicaciones en función del criterio del Médico Veterinario.

Kg por presentación:

Especie	Presentación	# kg p.v. por presentación
Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caprinos y ovinos	6 MUI	600 kg p.v.

Propiedades farmacológicas

Diclofepan® contiene 3 Penicilinas, dos de corta acción y una de larga acción (LA), en combinación sinérgica con Estreptomocina lo que le confiere un amplio espectro alta eficacia en pocas horas con un efecto prolongado de hasta 72 h.

Adicionalmente **Diclofepan®** contiene Diclofenaco sódico, un potente antiinflamatorio no esterooidal (AINE) auxiliar en el mantenimiento del bienestar del paciente, así como su pronta recuperación y retorno a la producción.

Diclofepan® es eficaz contra bacterias Gram + y Gram - asociadas a procesos infecciosos sistémicos y locales con proceso inflamatorio asociado.

Efectos secundarios y advertencias

No administrar por vía IV.

Uso en gestación, lactación o parto

El uso de este producto durante la gestación, lactación y del parto depende de la evaluación riesgo beneficio del Médico Veterinario.

Después del parto es factible el uso del producto.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No administrar en caninos ni felinos domésticos.

Tiempo de retiro

Carne: 30 días.

Leche: 72 horas.

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Ninguno relevante.

Presentación

Polvo para suspensión inyectable.

Frasco con polvo + Frasco con 15 ml diluyente.

Diclofepan®



Antibióticos

Uso veterinario.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
Manténgase en un lugar fresco y seco.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
No administrar este producto en equinos para consumo humano.
No superar la dosis recomendada.
Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx
panavet.com.mx
(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres
#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro.
México. C.P. 76139

Diclofepan®

PANAVET
Salud Animal

