Expectorante Broncodilatador

Reg. Q-0296-014

ISO 9001

Solución inyectable

Mucolítico, antusígeno y descongestionante de las vías respiratorias.

Fórmula

Cada 100 ml contienen:

Guayacol	5 g
Gomenol	3 g
Eucaliptol	2.2 g
Alcanfor	10 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos domésticos: Indicado como expectorante y broncodilatador. Auxiliar en infecciones respiratorias, neumonía, influenza y bronquitis.

Auxiliar en casos de broncoespasmo, irritación de las vías respiratorias, tos alérgica, faringitis, laringitis, bronquitis, neumonías, congestión nasal y bronquial entre otras afecciones del tracto respiratorio.

Administración y Dosis

Vía IM profunda.

Dosis por paciente:

Especies	Dosis por paciente
Bovinos productores de carne y leche y equinos	10 – 20 ml
Porcinos, ovinos y caprinos	5 – 10 ml
Caninos y felinos domésticos	3 – 6 ml

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario. Se recomienda 1 a 2 ocasiones por día durante 3 a 5 días.

Control del Tracto Respiratorio

Dosificaciones por presentación:

Especie	Presentación	# dosis por presentación*
Bovinos productores de carne y leche y equinos	50 ml	5 dosis
	100 ml	10 dosis
Porcinos, ovinos y caprinos	50 ml	10 dosis
	100 ml	20 dosis
Caninos y felinos domésticos	50 ml	16 dosis
	100 ml	33 dosis

^{*} De acuerdo a dosis mínima sugerida.

Propiedades farmacológicas

Expectorante Broncodilatador Es una solución de aceites esenciales formulados para uso parenteral, con propiedades expectorantes, mucolíticos, antisépticas y antitusígenas. Es además un vasodilatador cuyo efecto antipirético induce la sudoración y provoca un estímulo suave del aparato respiratorio y el sistema circulatorio.

El Guayacol es un fenol cuyo principal constituyente es el 2-metoxifenol. Tiene acción expectorante al aumentar las secreciones del tracto respiratorio mediante un mecanismo reflejo a partir de la irritación de la mucosa lo que da por resultado el aumento de la expectoración.

Efectos secundarios y advertencias

En algunos casos pueden presentarse desórdenes gastrointestinales.

Uso en gestación, lactación o parto

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, lactación ni parto.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No mezclar con otros medicamentos ni productos. No administrar por otra vía que no sea IM profunda.

Tiempo de retiro

Carne: 36 horas. Leche: 72 horas.

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

No se exponga al sol ni a temperaturas superiores a 30°C.





Control del Tracto Respiratorio

Presentación

Solución inyectable.

Frascos con 50 ó 100 ml.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

Reg. Panamá: RF 4178-08

Reg. Rep. Dominicana: 4854

Reg. Costa Rica: MX 12-52-08-2472

panavet@panavet.com.mx panavet.com.mx (+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139



