Hierro Dextrán Panamericana

Hierro Dextrán Panamericana

Reg. Q-0296-037

ISO 9001

Solución inyectable

Hierro dextrán al 10%.

Fórmula

Cada ml contiene:

Complejo de hierro dextrán equivalente a de hierro elemental	100 mg
Fenol	5 mg
Vehículo c.b.p.	1 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche (becerros) y porcinos (lechones): Indicado para la prevención y tratamiento de las deficiencias de Hierro.

Administración y Dosis

Vía IM profunda.

Dosis sugerida:

Especies	Dosis por paciente	
	mg	ml
Bovinos productores de carne y leche (becerros)	500 – 1000 mg	5 – 10 ml
Porcinos (lechones)	200 mg	2 ml

Porcinos (Lechones): Se recomienda 1 sola dosis.

<u>Bovinos productores de carne y leche (Becerros):</u> La dosis y duración del tratamiento dependerá de respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario.

Dosificaciones por presentación:

Especie	Presentación	# dosis por presentación*
Bovinos productores de carne y leche (becerros)	20 ml	4 dosis
	100 ml	25 dosis
Porcinos (lechones)	20 ml	10 dosis
	100 ml	50 dosis

^{*} De acuerdo a dosis mínima sugerida.

Vitaminas y Minerales

Propiedades farmacológicas

Hierro Dextrán Panamericana contiene Hierro Dextrán, el cual es un hematínico primario y es significativamente efectivo para el incremento de los niveles de la hemoglobina de lechones bajo condiciones de producción intensiva en los cuales el aporte de hierro vía leche materna es deficiente.

Una vez dentro de los eritrocitos, el hierro se une a proteínas para formar hemosiderina, ferritina o transferrina y es transportado a la médula ósea donde se incorpora a la hemoglobina. El hierro no es eliminado fácilmente, en su mayor parte es reutilizado y solo escasas cantidades son eliminadas.

Efectos secundarios y advertencias

Como toda preparación de hierro para uso parenteral puede producir toxicidad e incluso la muerte.

Uso en gestación, lactación o parto

El uso de este producto es viable durante la gestación, lactación y/o parto. Se recomienda previa evaluación del Médico Veterinario responsable.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No administrar por otra vía que no sea IM profunda.

Tiempo de retiro

Carne: 0 horas. Leche: No aplica.

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Se recomienda aplicar el producto sobre la tabla del cuello y/o anca.

Presentación

Solución inyectable.

Frascos con 20 ó 100 ml.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.





Vitaminas y Minerales

panavet@panavet.com.mx panavet.com.mx (+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139.



