

# Imidopan-B12®

Reg. Q-0296-080

ISO 9001

## Solución inyectable

**Profilaxis y tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis (babesiosis).**

### Fórmula

Cada ml contiene:

Imidocarb, dipropionato de	120 mg
Cianocobalamina (Vitamina B <sub>12</sub> )	50 µg
Vehículo c.b.p.	1 ml

### Especies en las que está indicado su uso y prescripción

*Bovinos productores de carne y leche y ovinos:* Indicado como profilaxis y/o terapia de piroplasmosis (babesiosis), anaplasmosis. Particularmente útil en casos en que el diagnóstico clínico diferencial en campo se dificulta.

### Administración y Dosis

Vía IM profunda.

Dosis sugerida:

Especies	Indicación	Dosis por patología	
		mg/ kg p.v.	ml
Bovinos productores de carne y leche y ovinos	Piroplasmosis únicamente	1.2 mg	1 ml/ 100 kg p.v.
	Infestación mixta Piroplasmosis + Anaplasmosis	3 mg	2.5 ml/ 100 kg p.v.

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario. Se recomienda una sola administración.

## Desparasitantes

Kg por presentación:

Especie	Presentación	# kg p.v. por presentación	
		Piroplasmosis únicamente	Infestación mixta Piroplasmosis + Anaplasmosis
Bovinos productores de carne y leche y ovinos	10 ml	1,000 kg p.v.	400 kg p.v.
	100 ml	10,000 kg p.v.	4,000 kg p.v.

### Propiedades farmacológicas

**Imidopan-B12®** contiene Imidocarb, el cual es un derivado de la diamidina que interfiere con el uso y la producción de poliaminas afectando el sistema nervioso y los mecanismos anticolinesterásicos. Aparentemente también evita la entrada inositol al eritrocito hospedero del parásito.

La absorción es rápida, 1 hora después de la aplicación aproximadamente. No es metabolizado. Es eliminado vía biliar principalmente aunque también se pueden encontrar rastros en orina. Su residualidad es amplia (< 4 semanas).

La cianocobalamina contribuye a la condición nerviosa y la producción de eritrocitos del paciente.

### Efectos secundarios y advertencias

Se puede presentar ligero edema transitorio en la zona de aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno.

En caso de sobredosis se puede presentar alteración del sistema nervioso como letargia, salivación, ataxia, tremor y convulsiones. En estos casos se recomienda atropina y consultar al Médico Veterinario.

### Uso en gestación, lactación o parto

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, lactación ni parto.

### Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida al Imidocarb.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No administrar con organofosforados ni antihelmínticos.

No administrar en hembras de ganado bovino lechero durante la producción láctea.

No administrar por otra vía que no sea IM.

### Tiempo de retiro

Carne: 28 días.

Leche: No se recomienda su uso durante la producción láctea.

Imidopan-B12®

**PANAVET®**  
Salud Animal



# Desparasitantes

## Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Ninguno relevante.

## Presentaciones

Solución inyectable.

Frascos con 10 ó 100 ml.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

Reg. Panamá:

RF-4176-08

panavet@panavet.com.mx

panavet.com.mx

(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139.

Imidopan-B12®

**PANAVET**  
Salud Animal

