

**ISO 9001** 

#### Solución inyectable

#### Ivermectina al 1% (endectoparasiticida) con Vitaminas A, D y E.

#### **Fórmula**

Cada 100 ml contienen:

lvermectina	1 000 mg
Vitamina A (retinol)	20'000,000 UI
Vitamina D₃ (calciferol)	3'000, 000 UI
Vitamina E (tocoferol)	2,000 UI
Vehículo c.b.p.	100 ml

#### Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne, porcinos, ovinos y caprinos: Indicado como endectoparasiticida con aporte vitamínico ADE profiláctico y tratamiento para:

#### Parásitos internos de bovinos y ovinos:

Parásitos gastrointestinales adultos y larvarios: Bunostomum spp., Cooperia spp., Haemonchus spp., Gaigeria spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., Trichostrongylus spp., Chabertia spp. y Trichuris spp. Adultos y larvas de los nemátodos pulmonares: Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus filaria y Protostrongylus spp.

#### Parásitos internos de porcinos:

Adultos y larvas gastrointestinales Ascaris spp., Hyostrongylus spp., Oesophagostomum spp., Strongyloides spp. y Trichuris spp.

Adultos y larvas pulmonares: *Metastrongylus spp.* Adultos y larvas renales: *Stephanurus dentatus.* 

#### Parásitos externos de bovinos, ovinos y cerdos:

Piojos: Haematopinus eurysternus, H. suis, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus y Bovicola — Damalinia — bovis.

Ácaros productores de sarna: *Psoroptes spp., Sarcoptes spp., Chorioptes bovis.* 

#### Administración y Dosis

Vía SC.

### **Desparasitantes**

#### Dosis sugerida:

	Dosis	
Especies	mg/ kg p.v. Ivermectina	ml
Bovinos productores de carne y leche	0.2 mg	1 ml/ 50 kg p.v.
Porcinos	0.3 mg	1 ml/ 33 kg p.v.
Ovinos	0.2 mg	0.5 ml/ 25 kg p.v.

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la infestación y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario.

Se recomienda una sola administración cada 15 a 30 días.

#### Kg por presentación:

Especie	Presentación	# kg p.v. por presentación*
Bovinos productores de carne y leche, ovinos y caprinos	10 ml	500 kg p.v.
	50 ml	2,500 kg p.v.
	100 ml	5,000 kg p.v.
	500 ml	25,000 kg p.v.
Porcinos	10 ml	330 kg p.v.
	50 ml	1,650 kg p.v.
	100 ml	3,300 kg p.v.
	500 ml	16,500 kg p.v.

<sup>\*</sup> De acuerdo a dosis mínima sugerida.

#### Propiedades farmacológicas

**Iverpan®-ADE** contiene Ivermectina el cual es una endectoparasiticida de amplio espectro de la familia de las avermectinas.

Actúa afectando la neurotransmisión del impulso neuromuscular de los parásitos al bloquear el neurotransmisor gama-amino-butírico (GABA) lo que provoca la parálisis del parásito y eventualmente la muerte del mismo.

Se metaboliza a nivel hepático en un 50%. Es eliminado vía renal y biliar.

Después de la aplicación es identificable en tejidos hasta 14 días en bovinos, 5 días en ovinos y 7 días en porcinos, particularmente en hígado, grasa corporal, riñones y músculo. La vitamina A auxilia en el mantenimiento de los epitelios. La vitamina D3 auxilia en la regulación del calcio circulante y su fijación. La vitamina E actúa como antioxidante lo que disminuye el catabolismo celular. En conjunto auxilian al paciente a la pronta recuperación particularmente en infestaciones crónicas complicadas con desnutrición y/o alteraciones reproductivas.



# pan®-ADE

## **Desparasitantes**

#### Efectos secundarios y advertencias

Se puede presentar ligero edema y dolor transitorio en la zona de aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno.

#### Uso en gestación, lactación o parto

No se recomienda el uso de este producto durante la gestación, lactación ni parto. El uso de este producto durante estas etapas debe ser de acuerdo a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario responsable.

#### Contraindicaciones

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la Ivermectina.

No administrar por otra vía que no sea SC.

Prohibido el uso de este producto en el control de la garrapata *Boophilus spp.* 

#### Tiempo de retiro

Carne: 28 días. Leche: 28 días.

#### Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

La Ivermectina libre puede afectar peces y ciertos organismos acuáticos, por lo tanto, se debe evitar que sobrantes del producto entren en contacto con este hábitat, enterrando o destruyendo los envases por incineración

#### **Presentaciones**

Solución inyectable.

Frascos con 10, 50, 100 y 500 ml.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx panavet.com.mx (+52) 442 309 5700 Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139.



