L-Vermifugare® 12% Inyectable

Reg. Q-0296-030

ISO 9001

Desparasitantes

Solución inyectable

Levamisol al 12% (antihelmíntico)

Fórmula

Cada 100 ml contienen:

L-Levamisol, clorhidrato de (equivalente a 12 g de Levamisol base)	14.11 g
Vehículo c.b.p.	100 ml

Especies en las que está indicado su uso y prescripción

Bovinos productores de carne y leche, porcinos y caprinos: Indicado como antihelmíntico profiláctico y tratamiento para formas maduras e inmaduras de *Haemonchus spp., Cooperia spp., Trichuris spp., Trichostrongylus spp., Bunostomum spp., Ostertagia spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus spp., Muellerius spp., Metastrongylus spp., Hyostrongylus spp., Oesophagostomum spp.* y *Ascaris suum.*

Administración y Dosis

Vía SC e IM profunda.

Dosis sugerida:

Especies	Indicación	Dosis por patología	
		mg/ kg p.v.	ml
Bovinos productores de carne y leche, porcinos y ovinos	Parásitos gastro-intestinales	5.64 mg	1 ml/ 25 kg p.v.
	Parásitos pulmonares	7.05 mg	1 ml/ 20 kg p.v.

La frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la infestación y de la respuesta clínica observada a criterio del Médico Veterinario.

Se recomienda una sola administración.

Kg por presentación:

Especie	Presentación	# kg p.v. por presentación	
		Parásitos gastro-intestinales	Parásitos pulmonares
Bovinos productores de carne y leche, Porcinos y Ovinos	100 ml	2,500 kg p.v.	2,000 kg p.v.
	500 ml	12,500 kg p.v.	10,000 kg p.v.

Propiedades farmacológicas

L-Vermifugare® 12% Inyectable contiene Levamisol, un antihelmíntico de la familia de los imidazotiazoles altamente eficaz, de amplio espectro y con buen margen de seguridad.

Actúa como antagonista de los receptores nicotínicos de acetilcolina en el músculo de los nematodos. Este efecto agonista reduce la capacidad de los machos sobre sus músculos para el control reproductivo y limita su habilidad para copular. También altera el resto del sistema nervioso, paralizándoles y consecuentemente provocando la muerte de los mismos.

Adicionalmente tiene propiedades inmunomoduladoras al ser un inmunoestimulante que incrementa las células NK y activa los linfocitos T, por lo que es recomendable su uso con inmunizaciones programadas.

Efectos secundarios y advertencias

Se puede presentar ligero edema y dolor transitorio en la zona de aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno.

Uso en gestación, lactación o parto

El uso de este producto durante la gestación debe ser de acuerdo a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario responsable.

Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida al Levamisol.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

Tiempo de retiro

Carne: 72 días.

Leche: 3 días.

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación
Se recomienda aplicar el producto sobre sobre la tabla del cuello y/o anca.
Cuando la dosis a administrar sea mayor a 10 ml, repartirle en al menos dos puntos de aplicación.

Presentaciones
Solución inyectable.
Frascos con 100 ó 500 ml.

Uso veterinario.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
Manténgase en un lugar fresco y seco.
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
No superar la dosis recomendada.
Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx
panavet.com.mx
(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres #107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. México. C.P. 76139.