

# Panaflor®

Reg. Q-0296-088

ISO 9001

## Solución inyectable

**Tratamiento integral para infecciones respiratorias (Florfenicol 30% + Expectorante + Desinflamatorio).**

### Fórmula

Cada ml contiene:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Florfenicol            | 300 mg |
| Diclofenaco sódico     | 15 mg  |
| Bromhexina clorhidrato | 5 mg   |
| Vehículo c.b.p.        | 1 ml   |

### Especies en las que está indicado su uso y prescripción

*Bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caprinos:*  
Tratamiento integral para infecciones del tracto respiratorio causadas por microorganismos sensibles al florfenicol, con componente inflamatorio y febril, y excesiva producción de moco.

En bovinos es eficaz en infecciones causadas por *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Corynebacterium pyogenes*.

En porcinos *Actinobacillus pleuroneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

### Administración y Dosis

Vía IM profunda.

Dosis sugerida:

| Especies                             | Dosis                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                                      | mg/ kg p.v. Florfenicol | ml               |
| Bovinos productores de carne y leche | 20 mg                   | 1 ml/ 15 kg p.v. |
| Porcinos, ovinos y caprinos          | 15 mg                   | 1 ml/ 20 kg p.v. |

La misma dosis debe repetirse cada 48 horas en función del criterio del Médico Veterinario.

La duración sugerida del tratamiento es de 2 administraciones continuas.

Kg por presentación:

| Especie                              | Presentación | # kg p.v. por presentación |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Bovinos productores de carne y leche | 100 ml       | 1,500 kg p.v.              |
| Porcinos, ovinos y caprinos          | 100 ml       | 2,000 kg p.v.              |
| Bovinos productores de carne y leche | 250 ml       | 3,750 kg p.v.              |
| Porcinos, ovinos y caprinos          | 250 ml       | 5,000 kg p.v.              |

### Propiedades farmacológicas

**Panaflor®** contiene Florfenicol al 30%, antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias al unirse a la subunidad 50S del ribosoma 70S e impedir la actividad de la peptidil transferasa. Esencialmente bacteriostático, a altas concentraciones tiene efecto bactericida en algunas cepas, siendo efectivo incluso sobre bacterias resistentes a antibióticos de primera intención. La vida media es de 18 horas por vía IM.

**Panaflor®** también contiene Bromhexina, la cual disminuye la viscosidad del moco al incrementar la actividad lisosomal. La Bromhexina es rápidamente absorbida con picos plasmáticos en 1 h. Es metabolizada vía hepática y eliminada vía renal.

Adicionalmente **Panaflor®** contiene Diclofenaco sódico, un potente antiinflamatorio no esterooidal (AINE) auxiliar en el mantenimiento del bienestar del paciente, así como su pronta recuperación y retorno a la producción.

### Efectos secundarios y advertencias

Se puede presentar ligero edema transitorio en la zona de aplicación el cual cede sin necesidad de tratamiento alguno.

### Uso en gestación, lactación o parto

El uso de este producto durante la gestación debe ser de acuerdo a la evaluación riesgo/ beneficio del Médico Veterinario responsable.

### Contraindicaciones

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No mezclar con otros medicamentos ni productos.

No administrar en becerros con menos de 1 mes de edad.

No administrar en lechones de 2 kg p.v. destinados consumo humano.

No administrar en hembras de ganado bovino lechero durante la producción láctea.

No administrar en toros utilizados con fines reproductivos.

No administrar más de 5 ml por sitio de aplicación en porcinos.

No administrar en caninos ni felinos domésticos.

Panaflor®

**PANA**VET®  
Salud Animal



## Tiempo de retiro

Carne:

*Bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos:* 30 días

*Porcinos:* 18 días

Leche: No se recomienda su uso durante la producción láctea.

## Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación

Aplicar en la tabla del cuello del paciente.

## Presentación

Solución inyectable.

Frasco con 100 ó 250 ml.

Uso veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

No superar la dosis recomendada.

Proteger de la luz solar.

panavet@panavet.com.mx

panavet.com.mx

(+52) 442 309 5700

Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres  
#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro.  
México. C.P. 76139

